

הטיפים של ארכימדס להצלחה בשאלון 581!



lezmanet ספר 581 של ארכימדס במשלוח עד הבית : <https://bit.ly/3ymwDNx>
חומרים נוספים בשאלון 581, ללא עלות, בקישור : <https://bit.ly/3pMB5jU>

דgesים כלליים ליום שלפני בחינת הבגרות:

- כדי לפתר שאלות מוקדמות "ונוחות" ולא שאלות אתגר מוגזמות שועלות לפגוע בביטחון העצמי ולהגבר את הלחץ לקראות הבחינה.
- מומלץ לחזור על דף הטיפים זהה ולマーク בו דgesים החשובים לכם במיוחד לשפר את הביטחון.
- כדי להכין את **הציוויל** לבחינה בתיק ערבות קודם. מרגיע ו גם יעיל. הקפידו להכין בתיק תעוזת זהות, אישורי התאמות לבחינה, כלי כתיבה, מחשבון, דף נושא, שתיה ומשחו קל לאכול במהלך הבחינה.
- מומלץ ללבת לישון בשעה סבירה כדי להימנע מתחושת עייפות במהלך הבחינה.

דgesים ליום בחינת הבגרות:

- חשוב לחשב "הצלחה" כבר מהבוקר. עברתם על כל החומר, פתרתם המונע מתכונות ובגרויות ואתם מדקלים זחויות ונושאות בעלי בעיה. אם למדתם טוב לבחינת הבגרות, אתם יכולים להיות רגועים.
- נאכל ארוחות בוקר ואחרים קלות. לא להזימים. תחושים רעב, בחילה או עייפות עלולים לפגוע ביצוע.
- מומלץ לא לפתר שאלות ביום הבחינה. התרומה שלחן נמוכה מאוד וחן עלולות להחיז אונטו.
- כדי לעבור בפעם האחרונה על דף טיפים זה ומאותו רגע, לא לעסוק במתמטיקה.
- כדי להגיע לתיכון כ-45 דקות לפני הבחינה כדי שננספיק לגשת לשירותים ולהתמקם בכיתה ללא לחץ.

דgesים למהלך הבחינה:

- עם קבלת טופס הבחינה, כדי לעبور על כל השאלות ולמצוא את השאלות שהכי נוח / קל להתחיל מהן, מבחינה קושי השאלה, אורך והידע שלי. כך, אתחיל עם תחווה חיובית יותר ואשאיר זמן לשאלות שדורשות יותר זמן.
- כדי להתחיל כל שאלה בעמוד חדש משלה ולהימנע מהחיצים וקווים מפרידים בין שאלות באותו עמוד.
- **נתקעתי על סעיף?** כדי לבדוק שוב את מה שמצאתי בסעיפים שקדמו לו והאם ניתן לעזור בהם בסעיף הנוכחי. במקרים רבים סעיפים מסתמכים על סעיף שקדם להם.
- **נתקעתי המונע על שאלה זהה לא מצlich?** כדי לעبور הלאה. בהמשך יבוא לי הרעיון איך לפרוץ את החומה.
- **יש שאלה המונע מלל ונתונים?** חשוב לקרוא בזירות ובתשומת לב. אין נתונים מיותרים!
- חשוב להזכיר על כתוב ברור, גדול ומורוח.
- כדי להזכיר את התשובות במלבן ולマーク אותן, כדי לשדר למורה סדר ורצינות.
- **סיימתי לפתר ונותר לי זמן?** כדי לבדוק את המבחן :

 - לא על ידי מבט מהיר, אלא לפתר מחדש מחדש סעיפים שאנו לא בטוחים לגבייהם.
 - לבדוק שbullet סעיף ותת סעיף ענייתי על מה שביישו. למשל, שבאמת חישבתי את השטח ולא רק את האורך.

דגשים כלליים:

- אם ההוראה בשאלת היא "הסביר" או "نمך", חשוב לתת הסבר משכנע, למשל הוספה שרטוט / סקיצה.
- חשוב שלא לרשום תשובה סופית מבלי להראות את הדרך לפתרון. זה יכול להוביל לפשילת הבדיקה.
- הסבר כמו: "חישבתי במחשבון" או "ניחשתי" לא מתתקבל.

עקרונות כתיבה במחברת הבדיקה:

- יש לכתוב את הבדיקה **בעט** שחור או כחול. יש להשתמש במרקם בהיר (למשל, צהוב או ורוד) ולא במרקם כהה (למשל, כחול או סגול) כי הוא פוגע ב巡视ת המחברת.
- מומלץ לענות על כל שאלה בדף נפרד.
- השאלות נבדקות לפי סדר הופעתן במחברת. תלמיד שמעוניין שהתרגיל לא ייבדק, יעביר קו על התרגיל.
- אין לרשום יותר מפתרון אחד לאותה שאלה. אם יופיע יותר מפתרון אחד, ייבדק רק הפתרון הראשון.
- דף שכותב בראשו "טיוטה", לא יבדק כלל. המילה "טיוטה" על כריכת מחברת הבדיקה אינה מבטלת את בדיקת המחברת. יש לסמן "טיוטה" על כל דף בנפרד במחברת.
- רצוי שהתלמיד ירשום בדף הבדיקה הראשון את מספרי התרגילים שהוא פתר.
- אסור לתלוш דפים מחברת הבדיקה. מחברת שיתלשו ממנה דפים עשויה להיפסל.

אלגברה:

- בפתרון משווה ריבועית ניתן להשתמש במחשבון מבלי להציג דרך פתרון.
- חשוב להזכיר על העתקה נכונה של המשווה / הביטוי מהבחן לדפי הכתיבה שלי.
- חשוב לעבוד לאט - לשים לב למינוסים, לשברים, לחזוקות ולכל מה שעולול להוביל לשגיאות נוספות.
- לשים לב בתחום ההגדירה: אולי אחד הפתרונות נפסל?
- **יצאה תשובה לא הגיונית?** אם הפתרון קצר, כדאי לנסות לאתר בו את השגיאה. אחרת, עדיף לפתור מחדש את הסעיף. לעיתיםணיזו לאייר שגיאת בפתרון ארוך, "ונפליםשוב" לטעות שהיתה קודמת ולא שמים לב אליה בבדיקה. פתרון חדש הוא הזדמנות להתחילה נקי - ולהינצל מאותה שגיאיה.

הסתברות:

- ניעזר בנתונים כדי להחליט אם אנחנו צריכים לפתור בעזרת תרשימים עז או בעזרת טבלה:
 - אם יש בשאלת **סדר זמני** (מבחון ראשון ואחריו ראיון ואחריו מבחון), נשתמש בתרשימים עז.
 - אם השאלה **מצירה כתבה בעיתון** (מתנגדים לבניה, بعد הבניה, סוג הבניה), נעדי' טבלה.
 - זכור שיש שאלות שמשלבות תרשימים עז בסעיף אחד וטבלה בסעיף אחר.
- נקבע להציג את האירועים באופן מתמטי במהלך הפתרון: $P \cap B$, $P(A)$, \bar{P} .
- כשנדרשים לחשב הסתברות של מספר מקרים, לעיתים קל יותר לחשב את ההסתברות המשלימה ל-1.
- חשוב לזכור متى נדרש חישוב של הסתברות מותנית ("ידעו ש...", "בתנאי ש...", "בהתנחת ש...").
- זכור שرك אירועים **בלתי תלויים** הם שקיימיםם את הכלל: $(B)P = P(A)P(B)$.
- בשאלת **הכללת פרמטר**, זכור שהסתברויות מסווגו בעורתו (לדוגמא $k = 0.5$) הן חיוביות. נקבע להציג בהן את ערכי k שקיבלנו ונפסול ערכי k שהציבתם גורמת להסתברויות להיות שליליות או 0.

בעיות מילוליות:

- לאחר קריית הנתונים נציר את תנועת הגורמים בעזרת חיצים כדי **להבין טוב יותר** את ההתרחשויות.
- ברוב המקרים, כדאי לשים ב-א את מה **שambilשים** למצוא בסעיף הראשון ("מהי מהירות המכונית?")
- לאחר שהגדכנו את המשתנים x ו- y נשתדל להימנע מהוספה משתנה שלישי.
- לרוב, נבנה את הטבלה בעזרת שורה של "תכנון הנסעה" ואחריה שורה של "הbijoux בפועל" או להליפין בעזרת שורה של "עד הפגישה ביניהם" ואחריה שורה של "מרגע הפגישה והלאה".
- נקבע על שימוש **באותן ייחדות זמן** לאורך השאלה. לשם כך, נמיר למשל נתון כ-30 דקות ל-0.5 שעות.
- בשאלת ההכללת פרמטר, נזכיר שגדלים שסומנו בעזרתו (המרחיק v או מהירות v – 10) הם חיוביים ונקבע על השווין הנובע מה שאלה את התנאים: $v < 0$, $v - 10 < 0$.
- לעיתים, למרות שהשתמשנו בשני משתנים בפתרון, בפועל נוכל (וונצטרך) למצוא רק אחד. **זה בסדר...**
- כאשר מתקיים ריבוע שווה אחת ובו שני גודלים (למשל $0 = 9y^2 - 10xy + x^2$), לרוב נתקבש למצוא את **היחס** בין x לבין y ולא את המשתנים עצמם. נסמן: $t = \frac{x}{y}$ כלומר $x = ty$, נציב ונמצא: $t = 1, 9$.
- לפני פתרון מערכת המשוואות, כדאי לקרוא שוב את השאלה ולזרז **שהתייחסנו לכל הנתונים**.
- כאשר אחד הגורמים בשאלת "הגיע שעה לפני...", חשוב לשים לב לאיזה אגף במשוואת הזמן נוסיף 1: **כשמדובר על הפרש בין זמני נסעה** נוסיף את הזמן לרכיב שהיה **חחות** זמן על הכביש.
- כאשר התנועה מתבצעת בשלושה ישר זווית, נוכל להשתמש **במשפט 피תגורס**.
- כאשר התנועה מתבצעת בשלוש שאינו ישר זווית, נבדוק האם **משפט הקוסינוסים** מתאים. זה נדר.
- נקבע לרשום את התשובה הסופית עם ייחדות המידה: 60 ק"מ, 5 שעות, 40 קמ"ש.

טריגונומטריה:

- נבדוק מה נתון לנו במשולש כדי להחליט באיזה משפט טריגונומטרי להשתמש:
 - אם נתונים צ.צ. או צ.צ. – נשתמש במשפט הסינוסים.
 - אם נתונים צ.צ. או צ.צ. – נשתמש במשפט הקוסינוסים.
- במידה ואורכי הצלעות הרלוונטיות מוגבלים **באמצעות אותו פרמטר** ניתן להשתמש במשפט הסינוסים והקוסינוסים כיון שהפרמטר בהכרח יצטמצם ונitin יהיה למצוא את הזווית המבוקשת.
- במהלך הוכחה תמיד לציין באיזה משולש אנחנו עובדים.
- לזכור שפועלות **Shift-Sin** במחשבון נותרת את הזווית החוצה, בעוד שיתכן שmobokshet zowitz kha.
- חשוב לזכור את שני הפתרונות האפשריים למשוואות הטריגונומטריות פשוטות:
- פתרונות המשוואה: $\sin x = \sin \alpha$ הם: $x = \alpha + 360^\circ k$ ו- $x = 180^\circ - \alpha + 360^\circ k$.
- פתרונות המשוואה: $\cos x = \cos \alpha$ הם: $x = \alpha + 360^\circ k$ ו- $x = -\alpha + 360^\circ k$.
- יש לשים לב אם המחשבון על Deg או על Rad ולפעול בהתאם.
- **הנוסחאות "הנסחרות"**: לשטח משולש $S = \frac{k_1 \cdot k_2 \cdot \sin \alpha}{2}$ ולשטח מרובע: $S = \frac{a^2 \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$

סדרות:

- כדי להוכיח שסדרה היא חשבונית יש להראות שההפרש $a_n - a_{n+1}$ שווה למספר קבוע.
- כדי להוכיח שסדרה היא הנדסית יש להראות שהמנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ שווה למספר קבוע.
- בסדרה שבה מספר זוגי של איברים, נסמן m איברים ונווכח שהאיברים האמצעיים הם: a_1, a_2, \dots, a_m .
- בסדרה שבה מספר אי-זוגי של איברים, נסמן $m + 1$ איברים ונווכח שהאיבר האמצעי הוא: $a_{\frac{m+1}{2}}$.
- נזכיר שהסכום S_n מתייחס ל- m האיברים **הראשוניים בלבד** ולא מתאים לסכום של m איברים אחרים.
- כאשר נתונה נוסחת סכום m האיברים הראשונים בסדרה נמצא את a_n כהפרש: $a_n = S_n - S_{n-1}$. נשים לב שקשר זה מוגדר רק כאשר $n \leq 2$, שהרי S_0 אינו מוגדר. לכן, לאחר שנמצא את הביטוי האלגברי a_n علينا לבדוק אם הצבת הערך $n = 1$ מקיימת את השוויון: $S_1 = a_1$.
- אם כן, הרי שהנוסחה שמצאנו לאיבר הכללי a_n מוגדרת לכל n .
- אם לא, הרי שהנוסחה שמצאנו לאיבר הכללי a_n מוגדרת רק עבור $n \leq 2$.
- כאשר האיבר הראשון a_1 , המנה q או ההפרש d בסדרה אינם ידועים, נזכיר שלא ידוע אם הם חיוביים או שליליים וניקח זאת בחשבון בשאלות לגבי סימני האיברים והאם הסדרה עולה או יורדת.
- נזכיר כי בסדרה הנדסית מתכונת המנה מקיימת: $q < 0$ או $0 < q < 1$ – וכן נוכל לפסול ערכי q שאינם בתחום. בנוסף, נזכיר כי אם $1 < q < 0$ והאיבר הראשון **שלילי**, אז הסדרה **עליה** (מתכונת -0).
- בסדרה הנדסית, כאשר יש לנו תת סדרה שמנתה q ותת סדרה שמנתה q^2 , לעיתים יתקבלו בנוסחת הסכום הביטויים: $1 - q^{2n}$ ו- $1 - q^n$. כאשר החזקה זוגית, הביטויים שווים וניתן לצמצם.
- כאשר מתקבלים ערכים $0, 1, -1, 0$, הם מוצבים על סדרה מנומנת. יש לפסול את התשובות האלו ולנקוק מדווק נפסלו למגוון שאלגברית הם התקבלו (כי עבר ערכים אלה מתקבלת סדרה מנומנת..).

גיאומטריה:

- נתיחיל בסימון כל הנתונים ומה **שנובע מהנתונים** על הشرطוט הנתון באופן ברור וצבעוני.
- **כל נתון אמרור להופיע** בשלב כלשהו במהלך הוכחה. נסמן כל נתון שהוכנס עד שנוודה שכולם הוכנסו.
- במהלך הוכחה, להקפיד להסביר באיזה משולש אנחנו עובדים.
- אם הוכחות קשור בין אורכים ($AB \cdot CD = BC \cdot AD$) סביר שבמהשך הוכיח נקבעו נתונים.
- אם יש נתון על מכפלת אורכים ($AB \cdot CD = BC \cdot AD$) אולי זה קשור ליחס הנובע ממנו: $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{CD}$.
- בדמיון ובփיפה **חוובה** להקפיד ולציין את סדר הקודקודים המתאים.
- חישוב שטח **במצולע לא שגרתי** או שאין בו גובה "נוח", יתבצע לרוב בחיבור/חיסור שטחים נוחים.
- כאשר הזווית 30° מופיעה בשאלת, נבדוק לגבי שימוש במשפט של המשולש שזוויותיו $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.
- **חיפוש רמזים גיאומטריים**: יש תיכונים - **אולי זה יחס 2:1?** ישרים מקבילים - **אולי זה תאלס?**

זווית ישרה - אולי פיתגורס?

- נזכר שקטע היוצא מקדקוד ומחלק את הצלע שמולו לשני קטיעים, יוצר שני מושלשים שהיחס בין שטחיהם הוא **יחס בין שני הקטעים שנוצרו**.
- אם בשאלה נתמכים שני חוציא זווית, ניתן שיש להשתמש בכך שזה מרכז **המעגל החסום במשולש**.
- נקפיד לרשום את התשובה הסופית עם יחידות המידה: 6 ס"מ, 50 סמ"ר.
- נזכר את הנוסחאות לשטח טרפז: $S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$, להיקף מעגל: $2\pi r = P$ ולשטח מעגל: $\pi r^2 = S$.

דיפרנציאלי:

- נזכר שתוחם ההגדרה של הפונקציה $(x)f$ עובר "בתורשה" לכל הנגורות שלה $(x')f$, $(x'')f$ והלאה וגם לכל פונקציה חדשה שתוגדר באמצעות $(x)f$ (לדוגמא $(x)f + x^2$).
- בחקרות שורש וטריגו נזכר שעשוות להתקבל **נקודות קיצון בקצה התוחם ולא בטוח שהן מאפסות את הנגורת**. לכן, עלינו ליזום בדיקה של קצוות התוחם ולהוסיף את הנקודות האלו לתשובה.
- נסמן על גבי סקיצת הפונקציה את **כל שיעורי הנקודות** שמצאו כדי להיות מוכנים לסייעי המשך.
- נזכיר כי אם הפונקציה היא זוגית, אז הנגורות שלה אי זוגית והנגורת השניה זוגית וכך הלאה.
- ברוב המקרים, סעיפוי המשך שאחרי שרוטוט הסקיצה מtabססים על הסקט מסקנות מהסקיצה עצמה וAINIM דורשים חישובים מורכבים נוספים.
- בפונקציית מנח ושורש, כשרוצים למצוא את **סוג הקיצון של הפונקציה** (מינימום או מקסימום) ניתן להשתחמש בנגזרת שנייה **מקוצרת** שכוללת גזירה של המונה בלבד ומצינינם: "נגזרת שנייה מקוצרת למציאת סימנו / סוג הקיצון". **נגזרת שנייה מקוצרת אינה עוזרת למצוא את נקודות הפיתול!**
- נזכיר את **כיווני הזרות, המתייחות והכיווצים**. למשל, עבור הפונקציה $x \sin x = f(x)$ בהזזה אופקית ימינה תתקבל הפונקציה: $(1-x)\sin^3(1-x)$ ו**שמאלה**: $(2+x)\sin^3(2+x)$.
- בהזזה אנכית מעלה תתקבל הפונקציה: $5 + (x)\sin^3(x)$ ו**מטה**: $2 - (x)\sin^3(x)$.
- **בمتיחה אופקית גרע הפונקציה** "מתרחב לצדדים" ביחס לציר ה- y ותתקבל: $(0.5x)\sin^3(0.5x)$.
- **בכיווץ אופקי גרע הפונקציה** "מצטמצם" לכיוון ציר ה- y ותתקבל: $(6x)\sin^3(6x)$.
- **במתיחה אנכית גרע הפונקציה** "מתרחב מעלה ומטה" ביחס לציר ה- x ותתקבל: $(x)\sin^3(x) = 7$.
- **בכיווץ אנכי גרע הפונקציה** "מצטמצם" לכיוון ציר ה- x ותתקבל: $x \sin 0.5x = 0.5x$.
- בחקרות **פונקציה טריגונומטרית**, יש לשים לב אס המחשבון על Deg או על Rad ולפעול בהתאם.
- נזכיר שבפונקציית שורש יתכנו **שתי אסימפטוטות אופקיות** שונות. אחת מימין ואחת משמאלי.
- כאשר מוגדרת פונקציה בעורת ערך מוחלט, "הקייפול" של הגראן המקורי עשוי ליצור נקודות קיצון "בצורת שפיץ". הן נקודות קיצון בגלל "הקייפול" ולכן הנגורת אותה נקודה לא בהכרח מתאפסת.
- כאשר מוגדרת פונקציה חדשה ובה ערך החזקה הוא t (לדוגמא: $(x)f = t$) יש לבדוק את התנagoות הפונקציה עבור ערכי t זוגיים לעמודת ערכי x אי זוגיים.
- בעיות קיצון אחראיות מיציאת ערך x מינימלי/מקסימלי, יש להוכיח שהוא אכן מינימלי או מקסימלי.
- כאשר קיימים ערך x_1 שמאפס את המונה וגם את המכנה קיימים חישד **נקודות אי רציפות סלקה** בפונקציה

- (”חויר“) אך זה לא וודאי. ננסה לצמצם את הפונקציה ככל הניתן ונמצא שוב את α .
- אם המכנה אינו מתאפס, מדובר בנקודת אי רציפות סליקה. אחרת, מדובר באסימפטוטה אנכית.
 - לרוב, הסעיפים האחוריים הם סעיפי הבנה. לא כדאי להתעכב עליהם יותר מדי. עדיף לעبور האלה, ובהמשך לחזור ולנסות.
 - בהוכחת זוגיות או אי זוגיות של פונקציה, לא ניתן להסתמך על הגרף בלבד. צריך להראות בדרך אלגברית או תוך הסתמכות על תכונות זוגיות / אי זוגיות של פונקציות מוכרות כמו אמנים למשל.

אינטרגרלים:

- לאחר ביצוע אינטגרל, כדאי לגוזר את התוצאה כדי לוודא שקיבלו בחזורה את האינטגרל המקורי.
- כאשר נחלק שטח לחלקים ונחשב כל אחד מהם בנפרד, נקבע להגדיר בבירור כיצד חילקנו.
- חשוב לזכור להוציא את הסיווג α בסיום האינטגרל בכל השלבים בהם טרם בוצעה האינטגרציה.
- אינטגרלים מיוחדים בטריגו: $\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx$, $\int \cos^2 x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx$
- נזכיר כי חישובי שטחים במערכות הצירים הם ביחידות ריבועיות (40 ייח'ר) ולא ביחידות סמ'ר.
- לביצוע אינטגרל למכפלה מורכבת או למנה שבה המכנה ”מסובך“ מהמונה - נשקל את שיטת החצבה.
- לביצוע אינטגרל למנה שבה המונה ”מסובך“ מהמכנה - נשקל לבצע חילוק פולינומיים.
- בחישוב נפח גוף סיבוב נזכיר শ্মাসরিদের בין ריבועי הפונקציות (ולא מעליים בריבוע את הפרש $(x^2 - f(x))^2$). בנוסף, נקבע לזכור להכפיל את הביטוי כולם ב- π :
- כאשר השטח המסתובב סביב ציר ה- α נמצא מתחת לציר ה- α , נקבע לרשום את הפונקציה שהגרף שלה התחתיו בהתאם לפונקציה השמאלית בנוסחה.

שמחנו לעוזר ובהצלחה מכל הלב!

צווות ארכימדס

לרכישת מרכזות של ספר ארכימדס יש לפנות ל"ייש הפטות" במייל yeshbooks@gmail.com או באתר :
<https://bit.ly/3FQfqBy>

lezemant ספר במשלוח עד הבית (עד 10 עותקים) :
<https://bit.ly/3ymwDNx>.

lezemant קורס סרטוני פתרונות לכל השאלות בספר 581 באתר 'מתמטיקורס' :
<https://bit.ly/3vU46wW>.



lezemant **ספר ארכימדס 581 מקוון** :
<https://bit.ly/2SGa8mx>

חומרים נוספים לתרגול בשאלון 581, ללא עלות :
<https://bit.ly/3hHKbLH>

צוותי הוראה, מעוניינים להצטרף לשיטת התפוצה של ארכימדס ולקבל
חומר לימוד ושאלות להעמקה? כנסו ל קישור :
<https://bit.ly/3SDksV>